

Segns characteristics dals generis da bulieus indigenis

Determinar bulieus cun agid dal cudesch «Bulieus da noss guauds»

L'onn 2005 è cumpari il cudesch tastgabel «Bulieus da noss guauds» da Men Bisaz. L'ovra da 175 paginas, illustrada ritgamain, cumpiglia las suandantas parts: Introduzion; Segns characteristics dals differentis generis da bulieus; Determinaziuns; Recepts; Indexs dals numis. La part introductiva tracta tematicas generalas da la micologia (Tge è in bulieu? Nua creschan ils bulieus? L'impurtaanza dal bulieu per l'uman; Tge cuntegna in bulieu? La construziun dal bulieu; In pèr reglas per cleger bulieus; Determinar bulieus; Explicaziun dals pleds scientifics). La part centrala dal cudesch furma alura la determinaziun da las singulas spezias indigenas che vegnan preschentadas en text e maletg sin betg main che 130 paginas.


Davart l'intent da si'ovra scriva l'autur en la prefaziun: «Il cudesch duess avair in dubel senn: surtut duess el svegliar l'interess per ils bulieus ed als render enconuschen a la populaziun indigena. Blers na sa fidan betg anc da far diever da quest dun exquisit da la natura.

Ma betg mo quel che racoglia ils bulieus per motifs economics duess pudair profitar da quest'ovra. Il segund senn che mes cudesch duess accomplir è numnadamain quel d'infurmara en el senn botanic.» I suonda ina survista e curta descripziun dals generis da bulieus indigenis (che vegnan mintgamai preschentadas en il cudesch cun lur spezias distinctivas).

Urden dals Agaricales (che cumpiglia la gronda part dals lamellers)

Ils glimatschs: Ils glimatschs èn in gener da bulieus fitg simpel da determinar. La cumparsa è tar tuts pli u main la medema. Las lamellas èn fitg charnus (grossas) e paran da considerar da tschairs. Ellas han la furma d'ina mesaglina e creschan adina dal pe engiu. Ils glimatschs creschan savens suenter plievgias, e quai per il solit l'atun. In'altra characteristic è il pe. Quel ha la furma d'ina lindorna senza chasa (glimaja). El è damai in pau stort e daventa vers la basa pli satigl che quai ch'el è sut il chapè. La pulvra da las sporas è adina alva en confront cun auters bulieus. Tut ils glimatschs èn mangiabels – els n'hant però betg ina gronda valur. Quest bulieu pon ins duvrar en in bun past ensenem cun auters bulieus.

Ils dratguirs: Il num da questi bulieus insinuescha che lur furma saja quella d'in dratguir. Quai n'è però betg adina il cas. El po senz'auter era avair in chapè cun ina fur-



Cuverta da la publicaziun.

Ils chalameris: Tgi n'enconuscha betg quels bulieus alvs sgiagliads en furma da scalin che davantan vaira svet rosa enddens per survegnir en curt temp ina colur naira e sa disfar finalmain en in paltaun da tinta naira? Il chalamer pelus crescha surtut il settember sin terrens fitg grass. Sia cumparsa na sa lascha betg scumbigliar cun auters bulieus. A quest gener appertegna era il chalamer grisich. El è pli robust ch'il chalamer pelus e dal tuttafat different da quel. Ins sto far attenzion da betg baiver alcohol 24 uras avant e suenter avair consumà in chalamer grisich. Dal rest è quest gener da bulieu fitg pitschen.

Ils zulpers: Il gener dals zulpers cumpiglia be trais sorts da bulieu indigenis. Da quellas èn duas sorts da tissi e vegnan menziunadas be per quai. Tuttas trais sorts han la medema surfatscha – cun la consequenza che las duas sorts da tissi pon vegnir scumbigliadas fitg bain cun la sort mangiabla. La differenza è simplamain quella: il bulieu mangiabel, il zulper fermentà, ha lamellas grischas, ils dus zulpers da tissi, il zulper cotschen ed il zulper verd, han las lamellas cotschnas u verdadas.

Ils stgarplinads: Ina gronda part dals bulieus ch'appartegnan a quest gener èn da tissi u nunmangiabels. Perquai èsi fitg impurtant d'enconuscher fitg bain ils stgarplinads da tissi. Fermamain da tissi è il stgarplinà cotschnent. El cuntegna ils medems tissis sco l'amanita mustgera, ma en concentriziuns bler pli autas. Il fitg è pitschen, il chapè ha ina grondezza da 3-8 cm e furma en in stadi tempriv in tgeiel che sa sviluppa alura cun ina goba. Il tgeiel d'venta pli tard era plat ed adina stgarpa radialmain. Las lamellas èn grisch fustgas, brinas d'uliva u brintetas. Il pe cilindric n'ha nagin culier.

Ils velers: Il gener dals velers cumpiglia divers suttgeneris, per exemplu ils pes glutis, ils chaus mutschignus, ils chaus fibrinus ed ils pes gross. Entaifer questi suttgeneris datti fitg paucs bulieus mangiabels. Percunter datti divers bulieus da tissi. Blers èn era privlus, damai ch'els sumeglian fermamain tscherts bulieus mangiabels d'autras spezias; quai vala per exemplu per il pe gross violet ch'è fitg ferm da tissi. Quest bulieu pon ins scumbigliar cun il tschiainder ch'è in fitg bun bulieu. Ils segns distinctivs da questi bulieus èn tranter auter ils suandants: els èn da giuvens plegads en in vel che stgarpa pli tard cun il crescher dal fitg e resta tatgà sco fils brins vi dal pe. Las sporas èn adina brinas. El è fitg deraà in noss guauds da guglias, ma era en gudas maschadadas.

Ils bovists / las toffas: Ina spezia enconuscha è surtut la toffa-luf, in bulieu ch'ha obtegnì ses num da sia cumparsa en il stadi madir: cura che l'intern dal bulieu è emplenì cun sporas madiras, sortan quellas ch'ins tutga il bulieu. Tge uffant n'ha betg in plaschairun da dar ina bella pajada ad in da questi bulieus per contemplar alura la pulvra brina? Per il solit è quest bulieu radund sco ina balla. La toffa gronda d'venta savens anc pli gronda ch'in chau. Ils bovists han mintgatant era la furma d'ina buttiglia ed èn variclad. I dat era exemplars pli pitschens, radunds e brins.

Ils lamellers: En quest chapitel dal cudesch vegnan tractads ils generis cun be duas u trais spezias da bulieus. Uschia existan p.ex. il tschiainder, il dratguir da mel, il stgagliel da tschep e divers auters.

Generis da bulieus ch'appartegnan ad ulterius urdens

Ils tgiruns: Quests bulieus han empè da lamellas ina spungia, quai vul dir che l'organ fructifitgant furma pitschens conducts, uschenumnadas poras che sumeglian ina spungia. Cun agid da la clav da determinaziun cuntegna in el cudesch pon ins differenziar ils divers aspects dal tgirun (vel entir u parzial; mo vel parzial che furma in culier; bluts, senza vel e senza culier).

Ils mutschigners: Il gener dals mutschigners cumpiglia be paucas spezias da bulieu-

us indigenas. Il segn distinctiv è il vel: da giuvens zuglia quel tut il bulieu ed è fitg mutschignus. La basa dal pe è tar tats mutschigners da colur mellen d'ov. Surtut il mutschigner fustig ha questa characteristic. Las lamellas èn grossas, stattan fermamain d'apart e cuntegna giu dal pe, savens èn ellas surtratgas cun verdarom. La pulvra da las sporas è adina nairenta.

Ils ruschlas: Las ruschlas èn fitg grevas da determinar. I n'existan naginas ruschlas da tissi, ma diversas nunmangiabels, damai ch'ellas èn fitg amaras. Las ruschlas han differents segns characteristics: ellas èn fitg bellas e da diversas colurs. Las lamellas èn fragilas, adina alvas u melnentas. Il pe è adina cilindric ed alv u cun in pau cotschen. El è sitg e sa lascha rumper facilmain. Ils micologs numnan las ruschlas era «cameleons», perquai che questi bulieus sa distinguon d'in lieu a l'auter en lur colur.

Ils latgers: Ils latgers èn, sco las ruschlas, bulieus fitg fragils. Surtut las lamellas ed il chapè rumpen facilmain. Il gust è, sco quel da las ruschlas, pli u main intensiv. Ils latgers n'hant nagin vel. Il segn il pli distinctiv da questi bulieus è il latg che sorta dal bulieu, cura che quel vegn donnegià e che dat ad el il num. Ins sto far bain attenzion, siond che questi gener da bulieu cumpiglia diversas spezias da tissi sco per exemplu il latger foppà. Laics fan il meglier da rimnar be quels latgers che produceschan in liquid cotschen, sco il latger cotschen. Quels bulieus èn fitg buns per brassar.

Ils chantarels e craterels: Ils chantarels ed ils craterels n'appartegnan beg als lamellers en il vair senn dal pled. Els n'hant betg lamellas, mabain avainas. I n'è betg pussaiavel da scumbigliar questi bulieus. Il chantarel è quel da primavaira, il craterel quel da l'atun tardiv che crescha be fin a circa 1300 m.

Ils porlauns: La gronda part da las spezias ch'appartegnan als porlauns crescha sin plantas vivas u mortas. I dat però era singulas spezias che creschan per terra, sco per exemplu il porlaun cler. Tar ils porlauns sa tracti d'ina famiglia che consista da divers generis: ils Albatrellus, ils Fomitopsis, ils Phaeolus e.a. Lur segn distinctiv: empè da lamellas han els poras sut il chapè. Varsaquant porlauns midan era la colur sch'els vegnan donnegiads. Quests bulieus èn plitost d'ars – els èn però buns per mangiar.

Ils barbers: Barbers è il num per ina gruppa da bulieus che n'è betg exnum parentads stretgamain in cun l'auter, ma dals quals las stresas che furman sporas creschan tuttas en furma da spinas. Il pli important per nus è il barber brin, damai ch'el è in bun bulieu da spezzaria. Empè da lamellas ha el spinas fitg fragilas sut il chapè. Quellas sumeglian fermamain ina barba – in fatg ch'ha dà il num a questi bulieus.

Ils murachels e lurachelis: Quests dus generis tutgan pli u main ensenem. Oma-duas han las sporas en pitschens foppas a la surfatscha. Ils murachels han in chapè plitost en furma da chapellina, ils lurachelis percunter in tal en furma da tscharvè. Els èn tats bulieus da primavaira e creschan gugent sin terrens sablunus ed umids. Be il lurachel d'atun fa in'exceptiun: sco quai che ses num di, crescha el numnadamain l'atun.

Las crestas: Las crestas han ina furma tut speziala. Igl è recomandabel da far attenzion cun rimnar crestas, perquai che quellas pon era esser da tissi, sco per exemplu la cresta da badugn. Las crestas èn singulares pervi da lur furmas characteristics e pon vegnir scumbigliadas.

La preschentaziun:
Men Bisaz. Bulieus da noss guauds. Cuira 2005.

Dapli infurmaziuns:
chatta.ch/?hiid=512
www.chatta.ch

Glimatsch da mars

E: glimatsch da marz, camarigl tampriv
S: carmaregl tumpriv
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.
Märzschnäckling

Chapè: 4-10 cm, mez arvieut, tar exemplars pli vegls plat, ur ondulà, gross, charnus, grisch, mai mutschignus, alv stgir metallic. Pe: charnus, plain, guliv, mai savens era in pau stort, alv, era tra-glischant sco argient, sut il chapè cuvernà sco cun prugina. Charn: senza savur e gust, sut la pel dal chapè grischenta, fitg delicata. Lamellas: strengas ina sper l'autra, pli tard d'apart e satiglias, creschan ferm giu dal pe, l'emprim alvas, pli tard grischentas. Sporas: pulvra alva. Lieus preferids e stagion: sut plantas da guglias, ma era sut chastagners, per il solit cuvert cun feglias e guglias, adina be da primavaira.

Mangiabel



La part principala dal cudesch furma la determinaziun da las singulas spezias da bulieus.